

CONGRESO PARIS 2.017

EFFECTOS SECUNDARIOS DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

El tratamiento quimioterápico es considerado, en estos momentos, el método terapéutico más eficaz para la patología tumoral. Los efectos secundarios son la consecuencia de que los fármacos utilizados se distribuyen por todo el cuerpo, sin especificidad territorial, afectando además de las células tumorales, a células sanas y normales de todo el organismo, en mayor o menor medida.

Las náuseas y vómitos, son los efectos secundarios más frecuentes, además de ser muy molestos. Pueden aparecer 2 horas después de la administración de fármacos, o aparecer a las 24 horas, pueden durar de uno a cinco días, y desaparecen espontáneamente. Para mejorar el estado general, náuseas y vómitos, de gran utilidad Pyrogenium, medicamento homeopático realizado a partir de carne de cerdo, buey y placenta, en proceso de descomposición. No debe sorprendernos que los efectos secundarios a la necrosis tisular, secundaria al tratamiento QT, queden antidotados parcialmente por dicho medicamento, que es en realidad tejido muscular en fase de necrosis o putrefacción.

Pero además de las citadas náuseas y vómitos, las complicaciones más frecuentes que hacen interrumpir el tratamiento farmacológico, son las anemias, leucopenias, y plaquetopenias o trombopenias. Estas alteraciones hematológicas responden satisfactoriamente, en mayoría de los casos, al tratamiento homeopático, que puede prevenir y tratar estos y otros efectos secundarios que a continuación se citan, junto a los medicamentos más utilizados para su tratamiento

Citamos a continuación los medicamentos más significativos para tratar los efectos secundarios más frecuentes.

Leucopenias: Base 28 (Laboratorios Erlingen), Tuberculinum, Cuarzo Turmalina Negra

Plaquetopenias: Base 28 (Laboratorios Erlingen), Cuarzo Turmalina Negra, Oxalicum Acidum

Náuseas y vómitos: Ruta, Pyrogenium, Serotonina, RENOVEN (BIO-VAC)

Astenia y fatigabilidad: Ruta, Serotonina, Pyrogenium

Afectación intestinal: Aconitum Napellus, Fluorita (combinación de los 3 colores yang, Symphytum (color amarillo anaranjado)

Afectación del miocardio: Ruta

Afectación de piel y faneras: Ruta, Pyrogenium

Afectación del tejido pulmonar: Tuberculinum, Cupresus Sempervivens

Afectación renal: Platina (color naranja), Ulexita (¿aproximación a color blanco?), Cuarzo Turmalina Negra y Carbo Animalis (color negro), Cuprum o Turquesa (color azul)

Caída de cabello: sin tratamiento eficaz

Patología musculo articular: Ruta, Cuarzo Turmalina Negra, A. Absinthium

Infertilidad: sin tratamiento eficaz.

El citado BIO VAC fue retirado del mercado en el año 2002, cuando era usado con éxito por miles de pacientes oncológicos para mejorar la supervivencia y el estado general. El citado medicamento es un conjunto de vitaminas y oligoelementos, carente de toxicidad, pero el ministerio de sanidad decidió retirarlo para proteger a los pacientes de posibles efectos secundarios, y 12 años después fue autorizada su venta de nuevo.

Las anemias pueden estar provocadas, en este caso por la administración de fármacos antitumorales, no entramos a valorar las anemias provocadas por pérdida de sangre, trastornos de malabsorción, transporte del hierro, enfermedades hematológica, o por el calor tóxico que quema la sangre, según la MTC. Esta alteración es más frecuente en personas en cuya cronobiología según el horóscopo chino existe un componente de fuego (caballo, cabra, perro, cerdo). En el caso de las anemias por calor tóxico, los medicamentos más adecuados son los portadores de la longitud cromática naranja, como Arsenicum loatum, Phosphorus, Sulphur lodatum, para dispersar dicho calor tóxico. Podemos comprender ahora las referencias al tratamiento de las anemias, descritas en la materia médica homeopática, para unos medicamentos que no contienen hierro, ni a. fólico, ni vitamina B12, ni eritropoyetina. Para el resto de las anemias secundarias a quimioterapia, los medicamentos más utilizados son: Cuarzo Turmalina Negra, Pyrogenium, Arsenicum lodatum.

De los medicamentos citados se ha realizado una combinación de cuatro, o cinco, para paliar los efectos secundarios citados, especialmente los digestivos y hematológicos.

En total han sido tratados más de 50 pacientes que presentaban alteraciones hematológicas (anemias, leucopenias, plaquetopnias) secundarios a QT que dificultaban en mayor o menor medida la continuidad del tratamiento, o incluso impedían continuar con los ciclos normales de QT. Los controles analíticos se han realizado en el medio hospitalario, por lo que en la mayoría de los casos no he tenido acceso directo a ellos, los resultados han sido considerados como satisfactorios, cuando se ha comprobado que el paciente reanudaba el tratamiento interrumpido, o se continuaba sin incidencias, pues las constantes hematológicas se mantenían dentro de límites fisiológicos, hasta la finalización del mismo, sin tener que interrumpir los ciclos de terapia. En este grupo se incluyen más de 15 personas que antes de iniciar tratamiento quimioterápico y durante el mismo, tomaban el tratamiento homeopático para evitar efectos secundarios.

Ocasionalmente se ha tenido que añadir Oxalicum Acidum al protocolo que se cita después, cuando se constatado la disminución de plaquetas o plaquetopenia.

El resultado ha sido satisfactorio, excepto en dos pacientes añosos, que debieron interrumpirlo definitivamente, por multiples efectos secundarios.

Entendemos como resultado bueno o satisfactorio la normalización de las alteraciones hematológicas, la disminución de la sintomatología digestiva, náuseas y vómitos, después del tratamiento, y la global mejoría del estado general.


Para evitar la afectación del estado general y las alteraciones hematológicas se ha utilizado el siguiente protocolo.

Protocolo Standard

Ruta + Pyrogenium + Cuarzo Turmalina Negra + Tuberculinum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día.

A este protocolo puede añadirse Serotonina para mejorar el estado general

Oxalicum Acidum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día, en caso de plaquetopenia (trombopenia)



Círculo de Goethe con la clasificación de las energías según C. Agrapart

Otros efectos secundarios:

Neuropatía periférica: La afectación de los nervios periféricos en las cuatro extremidades es una complicación habitual en los pacientes tratados con QT, entre un 30-40% de ellos va a experimentar este tipo de alteración, con dolor en las cuatro extremidades, que el paciente describe como dolor punzante y agudo, además de alteraciones de la sensibilidad y parestesias, que dificultan la capacidad de deambulación y la utilización de las manos. El tratamiento, como en casi todas las patologías del sistema nervioso, desde las neuralgias hasta la esclerosis múltiple, es la utilización del color azul (Cuprum Metallicum, Turquesa, Turmalina Indigolita, Corindón Azul), apoyado en este caso por el yoduro de sodio o Natrum Iodatium. Desde el punto de vista de la Cromatoterapia (chromatothérapie), esta patología puede ser interpretada como la invasión de la energía frío, provocada por la administración de fármacos antitumorales

Tratamiento:

Color azul (Cuprum Metallicum) + Natrum Iodatium (polaridad por riñón) + A. Absinthium
700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día

Nefropatía quimioterápica: Las alteraciones renales son relativamente frecuentes en los pacientes tratados con QT, especialmente cuando se utilizan derivados del platino (carboplatino, cisplatino, oxiplatino) además de melfalan, citarabina, gencitabina, y otros fármacos, capaces de provocar afectación de la función renal, con aumento de la creatinina

y disminución del filtrado glomerular, lo que en ocasiones puede provocar insuficiencia renal aguda o crónica. En otras ocasiones las alteraciones renales se asocian a proteinuria, además de orinas colúricas, hematuria, edemas de extremidades inferiores, astenia, etc. Habitualmente estas alteraciones son reversibles total o parcialmente. La homeopatía es eficaz para corregirlas, permitiendo normalizar la función renal alterada, excepto en la IRA (insuficiencia renal aguda) que requiere tratamiento hospitalario.

Tratamiento:

Platina (color naranja)+ Ulexita (¿color blanco?) + Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis (color negro) 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día.

La utilización prioritaria de los colores naranja y blanco, modulados por el color negro, nos invita a pensar que esta es una patología de tipo calor, que bloquea la energía de los riñones

Hepatopatía postquimioterápica: la QT puede provocar daños hepáticos, secundarios a la necrosis tóxica de los hepatocitos, lo que se traduce en elevación de la bilirrubina, de las transaminasas, alteraciones digestivas, disminución de la capacidad de detoxicación, y alteraciones de la coagulación. La alteración suele ser benigna y evoluciona hacia la curación, la homeopatía acorta el tiempo de recuperación.

Tratamiento:

Naja Tripudians + Nux Vomica o Arsenicum Iodatum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento dos o tres veces al día

Enteropatía postquimioterapia y postradioterapia: los fármacos utilizados pueden provocar la irritación de la mucosa intestinal, provocando un cuadro diarreico con o sin moco, secundario al tratamiento. Esta enteritis quimioterápica o radiante puede aparecer durante el tratamiento, o varios años después de haberlo recibido, sobre todo en el caso de tratamiento con radioterapia. Debemos insistir en que la radioterapia puede dejar secuelas indelebiles para el resto de la vida.

En ocasiones, en el 20-40% de los casos, puede aparecer mucositis oral (erosiones o ulceraciones en la mucosa oral, o cualquier parte del tracto intestinal) que tiende a remitir espontáneamente dos semanas después de suspender el tratamiento, lo mismo que la mayor parte de las diarreas.

En este caso estamos asistiendo a una patología yang, de humedad y calor, que requiere para su tratamiento colores yang, cuya utilización supone una respuesta orgánica Ying, de frío y sequedad

Tratamiento:

Fluorita + Symphytum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, 2-3 veces al día.

Si en Francia no es posible encontrar la Fluorita, puede recurrirse a la utilización conjunta de los colores verde (Vanadium Metallicum, Aurum Metallicum), naranja (Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum) y amarillo (Cobaltum Metallicum, Manganum Metallicum)

Estos medicamentos son útiles para paliar los efectos secundarios, después de cada ciclo de tratamiento radioterápico o quimioterápico o una vez finalizado todo el tratamiento, para dispersar el calor inflamatorio residual, pero dicho calor inflamatorio es una reacción desorganizada, al frío por necrosis tisular secundario a QT o RT. En consecuencia este tratamiento para dispersar el calor residual acantonado durante la fase de administración de QT, se basa en la utilización de los colores yang, para provocar una respuesta yin, de frío y sequedad.

Linfedema postquirúrgico: Es una complicación habitual en los casos en que se han resecado algunos ganglios linfáticos o se ha realizado tratamiento radiante sobre alguna cadena linfática, que tras provocar alteraciones inflamatorias se producirá una irreversible fibrosis de los vasos linfáticos, con el consiguiente enlentecimiento de la circulación linfática y edema de la/s extremidad/es, que deja fóvea a la presión. Esta complicación es menos frecuente en los pacientes sometidos a QT. El tratamiento homeopático es paliativo, pero no restablece la normalidad previa al tratamiento.

Tratamiento:

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día.

Si el anterior tratamiento no arroja resultados satisfactorios puede ser sustituido por:

Platina (color naranja) + Ulexita (color blanco amarillo) + Crisoberilo Cimófono (color amarillo)
700.000 K: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día

Osteoporosis : los distintos tratamientos pueden provocar pérdida de masa ósea, o acelerarla, en el caso de mujeres durante la menopausia.

Tratamiento:

Calcárea Phosphorica + Turmalina Indigolita (color azul) + Turquesa (color azul) + Pix Liquida (color negro) 700.000 K: 7-10 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día

Retinopatía quimioterápica

En los pacientes añosos o debilitados puede aparecer esta complicación, con paulatina pérdida de visión por destrucción del tejido retiniano.

Tratamiento:

Lithium Carbonicum 700.000 K gotas: 5 gotas dos veces al día. En este caso los resultados suelen ser mediocres.

Micosis quimioterápica

La candidiasis vaginal, o moniliasis, es una infección causada por la *Candida albicans*.

La *Candida albicans* provoca un cuadro de inflamación en la vagina o vaginitis, y la vulva o vulvovaginitis, provocando rubor, inflamación edematosa, prurito intenso y flujo vaginal amarillento o verdoso, maloliente e irritante.

La *Candida* es pues un germen saprofito, que viven en nuestro cuerpo sin crear patología, solo en circunstancias favorables es capaz de provocar infecciones. El pH ácido de la vagina, el sistema inmunológico y la presencia de una flora bacteriana vaginal impiden que la *Candida* se multiplique

Pero desde el punto de vista psicológico, la micosis vaginal es una especie de candado de seguridad para evitar la penetración del pene no deseado. "Lo siento cariño, pero no estoy en condiciones". En otras ocasiones puede simbolizar la dolorosa herida de una relación amorosa frustrante.

Tratamiento:

Yeso Cristalizado (Calcarea Sulphurica) + Candida Albicans 700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día

En caso de mala respuesta clínica por déficit inmunitario añadiremos:

Au Ag Cu Fe (oro, plata, cobre, hierro) + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al día.

En todos los casos es aconsejable la supresión de gluten, glucosa, además de leche y derivados

Los síntomas pueden desaparecer en el primer mes, y los cultivos pueden negativizarse a partir del segundo o tercer mes de tratamiento, pero para evitar las temibles recidivas es aconsejable mantener el tratamiento un mínimo de 5 meses.