

CONGRÈS DE PARIS 2.017

EFFETS SECONDAIRES DE LA CHIMIOTHÉRAPIE ET DE LA RADIOTHÉRAPIE

Le traitement par chimiothérapie est actuellement considéré comme étant la méthode thérapeutique la plus efficace pour lutter contre la pathologie tumorale. Les effets secondaires associés résultent de la distribution dans tout le corps des médicaments utilisés, de manière non spécifique, affectant aussi bien les cellules tumorales que les cellules saines et normales de l'organisme, de manière plus ou moins prononcée.

Les effets secondaires les plus fréquents, qui sont aussi extrêmement désagréables, sont les nausées et les vomissements. Ces derniers peuvent apparaître deux heures après l'administration du médicament, ou au bout de 24 heures. Ils peuvent durer de un à cinq jours et disparaissent spontanément. Pour améliorer l'état général, ainsi que les nausées et vomissements, le médicament homéopathique Pyrogenium est de grande utilité. Préparé à partir de chair de porc, de bœuf et de placenta en processus de décomposition, son efficacité n'est pas surprenante. En effet, ce médicament, qui est en réalité du tissu musculaire en phase de nécrose ou de putréfaction, contrebalance partiellement les effets secondaires de la nécrose cellulaire résultant du traitement par chimiothérapie.

Outre les nausées et les vomissements, les complications les plus fréquentes qui nécessitent l'interruption du traitement médicamenteux sont les anémies, les leucopénies et les baisses du niveau des plaquettes ou thrombopénies. Dans la plupart des cas, ces altérations hématologiques répondent de manière satisfaisante au traitement homéopathique qui, associé aux médicaments les plus utilisés pour leur traitement, permet de prévenir ou traiter ces effets secondaires ainsi que d'autres qui seront cités plus avant.

Ci-après sont cités les médicaments les plus significatifs pour le traitement des effets secondaires les plus fréquemment observés.

Leucopénies: Base 28 (Laboratoires Erlingen), Tuberculinum, Quartz Tourmaline Noire

Thrombopénies: Base 28 (Laboratoires Erlingen), Quartz Tourmaline Noire, Oxalicum Acidum

Nausées et vomissements: Ruta, Pyrogenium, Sérotonine, RENOVEN (BIO-BAC)

Asthénie et fatigue générale: Ruta, Sérotonine, Pyrogenium

Troubles intestinaux: Aconitum Napellus, Fluorite (combinaison des trois couleurs yang, Symphytum (couleur jaune orangé)

Affection du myocarde: Ruta

Affections de la peau et phanères: Ruta, Pyrogenium

Affection du tissu pulmonaire: Tuberculinum, Cupresus Sempervivens

Affection rénale: Platine (couleur orange), Ulexita (proche de la couleur blanche?), Quartz Tourmaline Noire et Carbo Animalis (couleur noire), Cuprum ou Turquoise (couleur bleue)

Perte des cheveux: pas de traitement efficace

Pathologie musculo-articulaire: Ruta, Quartz Tourmaline Noire, A. Absinthium

Infertilité: pas de traitement efficace

Le médicament BIO BAC a été retiré du marché en 2002, alors qu'il était utilisé avec succès par des milliers de patients oncologiques afin d'augmenter la survie et d'améliorer l'état général. Il s'agit d'un complexe de lysat protéique, vitamines et oligo-éléments, dépourvu de toxicité. Toutefois, le Ministère de la Santé décida de le retirer du marché pour protéger les patients de possibles effets secondaires, puis autorisa de nouveau sa commercialisation 12 ans plus tard.

Les anémies peuvent être provoquées par divers facteurs, dans le cas qui nous occupe par l'administration de médicaments anti-tumoraux. Nous ne traiterons pas ici le cas des anémies provoquées par des pertes sanguines, des troubles de l'absorption, le transport du fer, les maladies hématologiques, ou par la chaleur toxique qui brûle le sang, d'après la Médecine Traditionnelle Chinoise. Cette altération est plus fréquente chez les personnes qui possèdent dans leur chronobiologie, selon l'horoscope chinois, une composante de feu (cheval, chèvre, chien, cochon). Dans le cas des anémies dues à la chaleur toxique, les médicaments les plus adaptés sont porteurs d'une longueur d'onde chromatique orange, tels que Arsenicum Iodatum, Phosphorus, Sulphur Iodatum, afin de disperser cette chaleur toxique. On peut alors comprendre les références au traitement des anémies, décrites dans la bibliographie médicale homéopathique, pour des médicaments qui ne contiennent ni fer, ni acide folique, ni vitamine B12, ni érythropoïétine. Pour le reste des anémies secondaires de la chimiothérapie, les médicaments les plus utilisés sont : Quartz Tourmaline Noire, Pyrogenium, Arsenicum Iodatum.

Une combinaison de quatre ou cinq des médicaments cités a été utilisée, afin de pallier les effets secondaires, notamment les effets digestifs et hématologiques.

Au total, plus de 50 patients ont été traités. Ces patients présentaient des altérations hématologiques (anémies, leucopénies, thrombopénies) résultant de la chimiothérapie et compromettant de manière plus ou moins sévère la continuité du traitement, et allant même jusqu'à empêcher le déroulement normal des cycles de chimiothérapie. Les contrôles analytiques ont été réalisés en milieu hospitalier, raison pour laquelle je n'ai pas eu un accès direct à ces derniers. Les résultats ont été considérés comme satisfaisants lorsque le patient a pu reprendre le traitement interrompu ou quand le traitement a été suivi sans incident, étant donné que les constantes hématologiques restaient dans les limites physiologiques, jusqu'à la finalisation du traitement, sans nécessité d'interrompre les cycles de thérapie. Dans ce dernier groupe, on compte plus de 15 personnes qui prenaient le traitement homéopathique

avant de commencer la chimiothérapie et durant le traitement, dans le but d'éviter les effets secondaires.

De manière occasionnelle, il a été nécessaire d'ajouter Oxalicum Acidum au protocole décrit ci-dessous, lorsque l'on a observé la diminution du nombre de plaquettes ou thrombopénie.

Le résultat a été satisfaisant, sauf dans le cas de deux patients âgés qui ont dû interrompre de manière définitive le traitement en raison de multiples effets secondaires.

Un résultat considéré bon ou satisfaisant correspond à la normalisation des altérations hématologiques, la diminution des symptômes digestifs, des nausées et des vomissements, après le traitement, et à l'amélioration globale de l'état général.

Afin d'éviter l'affection de l'état général et les altérations hématologiques, le protocole suivant a été suivi.

Protocole Standard


Ruta + Pyrogenium + Quartz Tourmaline Noire + Tuberculinum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes trois fois par jour.

Pour améliorer l'état général, on peut ajouter Sérotonine 700.000 K à ce protocole.

Oxalicum Acidum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes trois fois par jour, en cas de thrombopénie.



VB-TR



Cercle de Goethe avec la classification des énergies selon C. Agrapart

Autres effets secondaires:

Neuropathie périphérique: l'affection des nerfs périphériques dans les quatre extrémités est une complication habituelle chez les patients traités par chimiothérapie. 30 à 40% d'entre eux vont souffrir ce type d'altération, avec des douleurs dans les quatre extrémités, décrites par les patients comme des douleurs mordantes et aiguës, ainsi que des altérations de la sensibilité et des paresthésies qui rendent difficiles la déambulation et l'utilisation des mains. Le traitement, comme dans la majorité des pathologies du système nerveux, allant des névralgies à la sclérose en plaque, se base sur l'utilisation de la couleur bleue (Cuprum Metallicum, Turquoise, Tourmaline Indigolite, Corindon Bleu), aidée dans ce cas par l'iodure de sodium ou Natrum Iodatatum. Du point de vue de la chromatothérapie, cette pathologie peut être interprétée comme l'invasion de l'énergie du froid, provoquée par l'administration de médicaments anti-tumoraux.

Traitement:

Couleur bleue (Cuprum Metallicum) + Natrum Iodatatum (polarité pour le rein) + A. Absinthium
700.000 K en gouttes: 5 gouttes de chaque médicament trois fois par jour.

Néphropathie chimiothérapique : les altérations rénales sont relativement fréquentes chez les patients traités par chimiothérapie, en particulier lorsque sont utilisés des dérivés du platine (carboplatine, cisplatine, oxyplatine) en plus du melfalan, cytarabine, gemcitabine et d'autres médicaments capables de provoquer des affections de la fonction rénale, avec augmentation de la créatinine et diminution de la filtration glomérulaire, ce qui peut parfois conduire à une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Dans d'autres cas, les altérations rénales sont associées à une protéinurie, ainsi que des urines colorées, une hématurie, des œdèmes des extrémités inférieures, une asthénie, etc. En général, ces altérations sont

totallement ou partiellement réversibles. L'homéopathie est efficace pour les corriger, en permettant la normalisation de la fonction rénale altérée, sauf dans le cas de l'insuffisance rénale aigue qui requiert un traitement hospitalier.

Traitement:

Platine (couleur orange)+ Ulexita (couleur blanche ?) + Quartz Tourmaline noire ou Carbo Animalis (couleur noire) 700.000 K en gouttes: 5 à 7 gouttes de chaque médicament deux ou trois fois par jour.

L'utilisation en priorité des couleurs orange et blanche, modulées par la couleur noire, nous invite à penser que cette pathologie est de type chaleur, qui bloque l'énergie des reins.

Hépatopathie post-chimiothérapie: la chimiothérapie peut provoquer des dommages hépatiques, découlant de la nécrose toxique des hépatocytes, ce qui se traduit par une élévation de la bilirubine, des transaminases, des altérations digestives, une diminution de la capacité de détoxification et des altérations de la coagulation. L'altération est en général bénigne et évolue jusqu'à la guérison, l'homéopathie permettant de réduire le temps de récupération.

Traitement:

Naja Tripudians + Nux Vomica ou Arsenicum Iodatum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes de chaque médicament deux à trois fois par jour.

Entéropathie post-chimiothérapie et post-radiothérapie : les médicaments utilisés peuvent provoquer l'irritation de la muqueuse intestinale et induire un épisode de diarrhées avec ou sans glaire, comme effet secondaire du traitement. Cette entérite chimiothérapeutique peut survenir durant le traitement ou plusieurs années après ce dernier, surtout dans le cas de la radiothérapie. Il est important de noter que la radiothérapie peut laisser des séquelles indélébiles tout au long de la vie.

Parfois, dans 20 à 40% des cas, une inflammation généralisée des muqueuses digestives peut apparaître (érosions ou ulcérations de la muqueuse orale ou de n'importe quelle partie de l'appareil intestinal) et a tendance à guérir spontanément deux semaines après avoir interrompu le traitement, comme c'est aussi le cas pour la plupart des diarrhées.


Dans ce cas, on assiste à une pathologie yang, d'humidité et de chaleur, qui doit être traitée par des couleurs yang, dont l'utilisation suppose une réponse ying du corps, de froid et de sécheresse.

Traitement:

Fluorite + Symphytum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes de chaque médicament deux à trois fois par jour.

S'il n'est pas possible de trouver de la Fluorite en France, on peut utiliser de manière conjointe les couleurs verte (Vanadium Metallicum, Aurum Metallicum), orange (Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum) et jaune (Cobaltum Metallicum, Manganum Metallicum).

Ces médicaments sont utiles pour pallier les effets secondaires, après chaque cycle de traitement par radiothérapie ou chimiothérapie, ou à la fin du traitement, pour disperser la chaleur inflammatoire résiduelle. Mais cette chaleur inflammatoire est une réaction désorganisée au froid dû à la nécrose tissulaire résultant de la radiothérapie ou chimiothérapie. Par conséquent, ce traitement capable de disperser la chaleur résiduelle accumulée pendant la phase d'administration de chimiothérapie se base sur l'utilisation des couleurs yang, pour provoquer une réponse yin de froid et de sécheresse.



SÉQUENCE ENERGETIQUE SELON C. AGRAPART

Lymphœdème postchirurgical : il s'agit d'une complication habituelle dans les cas où certains ganglions lymphatiques se sont desséchés ou dans le cas où un traitement par radiation a été réalisé sur une chaîne lymphatique et qui provoquera des altérations inflammatoires suivies d'une fibrose irréversible des vaisseaux lymphatiques, ayant pour conséquence un ralentissement de la circulation lymphatique et des œdèmes des extrémités avec signe du godet à la pression. Cette complication est moins fréquente chez les patients soumis à la chimiothérapie. Le traitement homéopathique est palliatif mais ne permet pas de rétablir la normalité préalable au traitement.

Traitement:

Quartz Tourmaline Noire 700.000 K en gel: application locale, une à deux fois par jour.

Si le traitement décrit ci-dessus ne donne pas de résultats satisfaisants, il peut être remplacé par :

Platine (couleur orange) + Gameda o Ferrum Metallicum ou Germanio (couleur rouge) + Carbo Animalis o Corindón Negro Estrellado (couleur noire) 700.000 K: 3 + 5 + 4 gouttes trois fois par jour.

Manganum Metallicum 700.000 K gouttes : 5 gouttes deux fois par jour

Ostéoporose : les différents traitements peuvent provoquer une perte de masse osseuse ou l'accélérer, dans le cas des femmes durant la ménopause.

Traitement:

Calcarea Phosphorica + Tourmaline Indicolite (couleur bleue) + Turquoise (couleur bleue) + Pix Liquida (couleur noire) 700.000 K: 7 à 10 gouttes de chaque médicament 2 ou 3 fois par jour.

Rétinopathie chimiothérapeutique : chez les patients âgés ou fragilisés, cette complication peut apparaître, avec une perte progressive de la vision par destruction du tissu rétinien.

Traitement:

Lithium Carbonicum 700.000 K en gouttes : 5 gouttes deux fois par jour. Dans ce cas, les résultats sont en général médiocres.

Mycose chimiothérapeutique

La chimiothérapie peut provoquer l'apparition d'une infection fongique partout dans le tube digestif et les organes génitaux. Le traitement est le même.

Dans le tube digestif provoquant apparaissent de lésions blanchâtres, veloutées et avec de sensation de sécheresse et d'irritation.

Habituellement Candida albicans est le champignon responsable de l'infection. Le Candida albicans provoque un syndrome inflammatoire du vagin (vaginite) et de la vulve (vulvovaginite) qui provoque des rougeurs, une inflammation de type œdème, un prurit intense et des pertes vaginales jaunes à vertes, malodorantes et irritantes.

Le Candida est un germe saprophyte, qui est naturellement présent dans notre corps sans créer de pathologie et qui est capable de provoquer des infections dans certaines circonstances favorables. Le pH acide du vagin, le système immunitaire et la présence d'une flore bactérienne vaginale empêchent le Candida de se multiplier.

Mais du point de vue psychologique, la mycose vaginale est une sorte de cadenas de sécurité permettant d'éviter la pénétration d'un pénis non désiré. « Je suis désolée chéri, mais je ne suis pas en état. » Dans d'autres occasions, elle peut symboliser la blessure douloureuse d'une relation amoureuse frustrante.

Traitement:

Plâtre Cristallisé (Calcarea Sulphurica) + Candida Albicans 700.000 K en gouttes: 7 gouttes de chaque médicament deux ou trois fois par jour.

En cas de mauvaise réponse clinique due à une immunodéficience, on ajoutera :

Au Ag Cu Fe (or, argent, cuivre, fer) + S (Soufre) 700.000 K en gouttes: 8+2 gouttes trois fois par jour.

Dans tous les cas, il est recommandé de supprimer le gluten, le glucose, ainsi que le lait et ses dérivés.

Les symptômes peuvent disparaître durant le premier mois et les cultures peuvent être négatives à partir du deuxième ou troisième mois. Mais afin d'éviter les possibles récurrences, il est conseillé de maintenir le traitement au moins pendant 5 mois.